

Οδηγίες χρήσης σε Πορτοκαλιές/Λεμονιές

1. Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο >3,6% και CRI>36

Φάση ανάπτυξης	Nano.T® Fe	Calcito
Προ-άνθηση	50 g/Φυτό	50-60 g/Φυτό
Μετά την καρπόδεση και τη μεγέθυνση των καρπών	50 g/Φυτό	50-60 g/ Φυτό

Για νεαρά δέντρα χρησιμοποιείτε τη μισή δοσολογία-συστήνεται να γίνεται εναλλαγή των δύο προϊόντων

2. Εδάφη με χαμηλή έως μεσαία περιεκτικότητα σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο <3,6% και CRI<36

Φάση ανάπτυξης	Nano.T® Fe	Calcito
Προ-άνθηση	30 g/Φυτό	30-50 g/Φυτό
Μετά την καρπόδεση και τη μεγέθυνση των καρπών	30 g/Φυτό	30-50 g/Φυτό

Για νεαρά δέντρα χρησιμοποιείτε 2/3 της συνιστώμενης δοσολογίας- συστήνεται να γίνεται εναλλαγή των δύο προϊόντων

Εφαρμόστε το **NANO.T Fe** και το **Calcito** με ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ



Καλλιεργήστε σωστά για να τραφείτε καλύτερα